

# INDICACIONES PREVIAS.

➤ Scanner



**CEREBRO SIMPLE:** Sin preparación

**CEREBRO CON CONTRASTE:** 6 horas de ayuno

**CUELLO:** siempre con contraste

**ANGULO PONTOCEREBELOSO:** Siempre con contraste

**ABDOMEN SIMPLE:** Sin preparación

**ABDOMEN CON CONTRASTE:** 6 horas de ayuno

**ABDOMEN Y PELVIS:** En ayuna

**PIELOTAC:** Vejiga llena

**UROTAC:** Ayuna y vejiga llena

**ANGIOTAC DE CEREBRO:** 6 horas de ayuno

**ANGIOTAC DE ABDOMEN:** 6 horas de ayuno

**ANGIOTAC DE TORAX:** 6 horas de ayuno

**TAC DE RODILLAS:** Si dice con contracción y relajación del cuádriceps son 2 códigos.

## **IMPORTANTE:**

**Todo paciente diabético que este tomando : METFORMINA, GLAFORNIL, GLUCOPHAGE, DIABETYL, DIAGLITAB, FINTAXIM, GLICENEX, GLIDANIL, GLIFORTEX, HIPOGLUCIN, NIVALIN, BI-EUGLUCOM-M, DIAGLITAB-PLUS, GLICENEX DUO, GLIMET, GLUCOVANCE, GLUKAUT, AVANDAMET, ROSIMET.**

**Debe suspenderlo 24 horas antes y 48 horas después del examen. Todo paciente que tenga una enfermedad crónica tiene que traer un examen de creatinina reciente de no más de 7 días.**

**Todo paciente mayor de 60 años tiene que traer un examen de creatinina reciente de no más de 7 días.**